CUENCA RÍO YAQUE DEL NORTE



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

UNIDADES DE RECURSOS PARA LA PLANIFICACION DE LOS SUELOS (URP)

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Escala: 1:150,000

LEYENDA

Clases	Descripción	km²
2	Material parental constituido rocas ígneas a metamórficas ácidas parcialmente meteorizadas. El clima es húmedo. La precipitación anual varía entre 1000 y 2000 mm; la temperatura anual oscila entre los 20° y 25°. La vegetación natural es Bosque Húmedo Subtropical y Bosque Húmedo Montano Bajo, constituida por los subgrupos de suelos: Dystropepts líticos (Paralíticos), Dystropepts típicos, Ustropepts líticos, Ustropepts típicos y Dystropepts fluvénticos.	1774.47
16	El material subyacente está constituido por aluvión. El clima es húmedo, con precipitación que varía entre los 1200 y 1700mm, y una temperatura media anual que oscila entre los 26 y 28°C, con poca variación estacional. La vegetación natural corresponde a Bosque Húmedo Subtropical. La URP está constituida por dos subgrupos de suelos: Ustropepts y Eutropepts fluvénticos que se encuentran en la terraza actual del río.	180.27
17	Esta unidad está ocupa parte de las provincias Espaillat, La Vega y Salcedo. E subyacente son sedimentos aluviales. El clima es húmedo. La precipitación media anual varía de 900 a 1400mm y la temperatura media anual varía de 24 a 28 La vegetación natural corresponde a Bosque Húmedo Subtropical. La fertilidad está dada por suelos: Pellusterts típicos y Cromusterts entícos.	12.68
21	Unidad formada por valles intramontanos. El clima es moderado con una precipit anual de 1000 a 1200mm. La temperatura media anual varía de 18 a 22 La vegetación natural fue bosque muy húmedo, cambiando a bosque húmedo. Los principales suelos son: Dystropepts acuicos, Dystropepts fluvacuénticos, Dystropepts típicos y Dystrop fluvénticos.	21.22
24	Esta URP está localizada en la cordillera Septentrional y la Sierra de Bahoruco. El material subyacente está formado por roca calcárea. El clima es húmedo, la precipitación anual varía de 1,000 a 1,700mm y la temperatura media anual oscila de 20 a 25. La vegetación natural corresponde a Bosque muy Húmedo Subtropical. Esta unidad constituida por subgrupo de suelos Eutropepts típicos.	216.38
27	Está localizada en las colinas y pequeños valles de los municipios de Jánico y San José de Las Matas. El material subyacente está formado por rocas calizas. El clima es húmedo, la precipitación anual oscila entre los 1000 y 1500mm, y la temperatura varía de 20 a 25 La vegetación natural corresponde a Bosque Húmedo Montano Bajo. El subgrupo dominante es el Eutropepts típicos	1268.45
28	Está localizada al este del lago Enriquillo. Son suelos formados sobre aluviones, susceptibles a deterioro por la acumulación de sales y sodio. El clima es seco y caluroso, la precipitación varía entre 400 a 900mm y la temperatura de 26 a 28 La vegetación monte espinoso subtropical. Los subgrupos predominantes dentro de esta URP son: Camborthids ácuicos y Torriorthents típicos	0.90
29	Los suelos de esta unidad se han desarrollado sobre depósitos aluviales marinos y fluviales. El clima es seco, la precipitación anual varía entre 400 y 900mm y la temperatura media anual oscila entre 26 a 28 La vegetación natural corresponde a bosque seco subtropical. Los subgrupos dominantes en esta unidad son: Torrifluvents ústicos, Fluvaquents aéricos y Torriorthents típicos	420.39
35	Ocupa las áreas planas, onduladas y las colinas en la parte occidental de los valles del Cibao y de San Juan de la Maguana. El clima es ha precipitación anual entre los 1000 y 1400mm y la temperatura oscila entre los 24 a 28 La vegetación natural corresponde a bosque húmedo subtropical. Los suelos principales clasificados como Ustropepts típicos	415.56
36	Se encuentra localizada en la porción occidental del Valle del Cibao. El material subyacente está constituido por aluvión y conglomerados calcáreos. El clima es seco. La precipitación anual varía de 600 a 800mm y la temperatura varía de 26 a 28 La vegetación natural corresponde a bosque seco subtropical. Los subgrupos principales son: Torriorthents ustólicos y Camborthids ustólicos	794.15
37	Está ubicada en la llanura costera del Atlántico. El material subyacente está constituido por rocas calizas y sedimentos aluviales. El clima es húmedo. La precipitación anual varía de 1000 a 1400mm y la temperatura de 24 a 28 La vegetación natural corresponde a Bosque húmedo Subtropical. Los grupos de suelos principales de esta URP son: Tapaquepts aéricos, Ustropepts fluvénticos y Ustropepts típicos	5.82
38	Está localizada en el Valle del Cibao. Los suelos se han formado a expensas de conglomerados calcáreos y sedimentos aluviales. El clima es seco. La precipitación anual varía de 600 a 900mm y la temperatura de 24 a 28 La vegetación natural corresponde a Bosque Seco en Transición a Bosque Húmedo Subtropical. Los grupos dominantes de suelos en esta unidad son los Haplustolls típicos y Ustropepts típicos	649.83
40	Esta unidad ocupa áreas montañosas de las cordilleras Central y Oriental, y de la Sierra de Samaná. El material subyacente está formado por rocas ígneas y metamórficas. El clima es húmedo; la precipitación anual varía de 1300 a 2000mm y la temperatura oscila entre los 21 y 24 La vegetación natural corresponde a Bosque Húmedo Subtropical Los principales suelos de esta unidad son: Dystropepts típicos	417.14
41	Ocupa colinas altas y bajas de las cordilleras Central y Septentrional. El material subyacente está constituido por rocas calizas. El clima es seco, con precipitación anual que varía entre los 400 y 700mm y la temperatura media anual oscila entre los 24 y 29°C. La vegetación natural corresponde a bosque subtropical; los principales suelos de esta URP están clasificados como Torriorthents típicos, Torriorthents lit	524.04
42	Esta unidad está ubicada entre las provincias de La Vega y Santiago. El material subyacente está constituido de roca caliza y sedimentos aluviales. El clima es semi seco. La precipitación anual varía de 800 a 1000mm, y la temperatura entre 23 a 26. La vegetación natural corresponde a Bosque Seco Subtropical. Los principales suelos son: Ustropepts típicos y Ustropepts	166.98

SIMBOLOGÍA

- Cabecera de Municipio
- Cabecera de Municipio
- Sección Municipal
- Lagos y Lagunas
- Ríos y Arroyos
- Límite Cuenca
- Límite Cuencas Aledañas
- Carretera

Edición: Agosto, 2015

Fuente: OEA Año, 1965 - 67.