


PROVINCIA LA ALTAGRACIA



UNIDADES DE RECURSOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LOS SUELOS (URP)

**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES**

Escala: 1:100,000

LEYENDA				
URP	Descripción	km ²	%	
03	Está localizada en áreas montañosas, cuyo material subyacente está constituido por rocas calizas, siendo los subgrupos dominantes de suelos: Tropodúctiles y Dysoxetrops típicos. El clima corresponde a bosque húmedo subtropical, con pluviometría media anual que oscila entre 1500 y 2000 mm y con temperatura media anual entre 25 y 27°C.	245.73	19.65	
04	Ocupa las terrazas marinas recientes del paco, incluyendo playas, olénagas costeras y dunas de las llanuras costeras del Atlántico El clima es húmedo, con una ligera estación seca durante el primer trimestre del año, con una precipitación anual que oscila entre los 1400 y 2000 mm y una temperatura media anual que varía entre 25° y 27° C. La vegetación es la característica de Bosque Húmedo Subtropical (bh-S), alterada por la actividad del hombre. Los subgrupos dominantes de suelos son: Tropoxetrops aéreos, Fluvauxets hísticos y Tropofuents típicos.	0.30	0.02	
05	Ocupa la llanura costera adelfana a Cabo Engaño y Boca de Yuma, de superficie áspera e irregular con arrecifes coralinos y rocas superficiales. El material subyacente está constituido por caliza coralina. El clima es subhúmedo, con precipitación anual que varía entre 1000 y 1200mm y temperatura media anual que oscila entre los 26 y 27 °C. La vegetación corresponde a bosque seco subtropical en transición. Los subgrupos dominantes son Ustortrops líticos y Ustropetrops típicos.	1.96	0.16	
07	Esta URP está compuesta por llanuras y áreas onduladas, con material subyacente de origen aluvial antiguo y lacustre, clasificados como: Tropoxetrops líticos y los Dysoxetrops Fluventícos y Ustropetrops típicos. El clima es seco en el primer trimestre; precipitación anual que oscila entre los 1600 y 2000 mm y temperatura media anual de 26° a 28 °C. La vegetación natural corresponde a bosque húmedo subtropical.	123.61	9.88	
12	Ocupa llanuras costeras, cuyo material subyacente está constituido de roca caliza coralina, presentando suelos profundos con pendientes inferior a 8 % y pocos profundos con pendientes que alcanza el 15 %, bien drenados, moderadamente alcalinos y de permeabilidad media, clasificados como Ustropetrops típicos y Ustropetrops líticos y fluventícos, respectivamente. El clima es bosque húmedo, con temperatura media anual entre los 26 y 27 °C con ligera variación estacional. La vegetación natural es de bosque húmedo, pero ha sido modificada por la actividad del hombre, básicamente en caña de azúcar y pastos.	568.02	45.41	
23	Ocupa llanuras costeras de relieve plano a ondulado con suelos pocos profundos, y profundos clasificados dentro de los subgrupos Ustortrops líticos y Ustropetrops típicos, respectivamente, originados a partir de caliza coralinas. El clima es húmedo con precipitación anual que varía entre los 1000 y 1400 mm, y una temperatura media anual de 26 a 27 °C y vegetación correspondiente a bosque húmedo subtropical. Estos suelos son arcillosos, moderadamente profundos, bien drenados, moderadamente alcalinos, con alta saturación de bases y permeabilidad lenta.	213.02	17.03	
44	Ocupa las colinas con pendientes de 15% a 30% y los pequeños valles con pendientes inferiores a 15%, cuyos suelos están formados de lutitas y tobas volcánicas, con textura arcillosa, drenaje bueno y permeabilidad moderadamente lenta; clasificados como Ustropetrops típicos, Ustropetrops fluventícos y Ustropetrops arcillosos, respectivamente. El clima es húmedo con una estación seca en el primer trimestre del año, la precipitación anual varía de 1300 a 1500 mm y la temperatura media anual oscila de 25° a 26 °C.	18.31	1.46	
45	Ocupa las colinas con pendientes de hasta 30% y los pequeños valles, con material subyacente de caliza coralina. Los suelos dominantes en esta unidad están clasificados como Ustropetrops típicos y Ustropetrops fluventícos respectivamente. Presenta clima relativamente seco con precipitación anual de 1000 a 1200 mm, con una estación seca marcada durante el primer trimestre y la temperatura media anual es de 25° C en sentido general. Los suelos son profundos, bien drenados, de textura franca a franca arcillosa, ligeramente alcalinos, alta saturación de bases, y permeabilidad moderadamente lenta.	79.86	6.38	

SIMBOLOGIA

- | | | | |
|---|-----------------------|---|--|
|  | Capital de Provincia |  | Carretera Pavimentada Transitable
Todo el Año |
|  | Cabecera de Municipio | | Carretera no Pavimentada Transitable
por Todo Tipo de Vehículo |
|  | Distrito Municipal | | Carretera no Pavimentada Transitable
en Tiempo Seco (Vehículo Todo Terreno) |
|  | Sección Municipal |  | Limite Provincial |

 Ríos y Arroyos

Edición: Agosto, 2010
Fuente: Secretaría de Estado de Agricultura - SEA-, Año 1985.