



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MEDIO AMBIENTE

Símbolos de la

Dirección de Educación Ambiental



¿Qué temas trataremos?

Flor Nacional

Árbol Nacional

Ave Nacional

- *Sus nombres comunes y científicos*
- *Datos históricos*
- *Motivos de elección*
- *Características generales*

Flor Nacional

“La Rosa de Bayahíbe”

Leuenbergeria quisqueyana (Alain) Lodé

Caryophyllales > Cactaceae

Colectada en República Dominicana

9 de julio 1977



Es un arbusto de hasta 6 m de altura,
con el tronco revestido por **areolas**

Las hojas son **elípticas** y de color
verde brillante cuando son nuevas.



Las flores brotan de la **parte terminal** de las ramas, son muy vistosas con pétalos rosados.



Sus frutos son **globosos**, verde amarillentos al madurar y contienen numerosas semillas negras.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MEDIO AMBIENTE

Es una especie **dioica**, esto quiere decir que tiene individuos macho y hembra, a diferencia de otras plantas que suelen tener flores con ambas características sexuales.

De yohanature





La flor macho a su vez
posee anteras rosadas
y/o amarillas con
polen

La flor hembra es de
centro amarillo
brillante, lleno de
estigmas que retienen
el polen de la flor
macho.

De yohanature

Estado de conservación



Es endémica de nuestra isla



Ley No. 146 del 2011

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.- Se designa a la Caoba, *Swietenia mahagoni* (L) Jacq, Árbol Nacional de la República Dominicana.


Artículo 2.- Se designa la Rosa de Bayahíbe, *Pereskia quisqueyana* Alain, Flor Nacional de la República Dominicana.

Artículo 5.- Se deroga el Decreto No.2944, del 16 de julio de 1957, que designa la flor de la caoba, como Flor Nacional.

Árbol Nacional


Swietenia mahagoni (L.) Jacq. “*La Caoba*”

De Max J. Ford




Familia: Meliaceae





De Wayne Longbottom




De daniel_02


Árbol de hasta 25 metros; sus frutos son unas cápsulas ovoideas, leñosas, que abren en 5 valvas, semillas aladas. La madera de color marrón rojizo, pesada, dura y resistente a los insectos.

Se puede encontrar con flores en los meses de marzo a junio; y con frutos de junio a febrero

porlosjovenes

Se suele encontrar en los bosques húmedos y semi-secos a baja elevaciones en toda la isla, Florida, Bahamas y Las Antillas Mayores.





Distribución de la Caoba, especie nativa de nuestra isla

Ave Nacional



Dulus dominicus
(Linnaeus, 1766)

“La Cigua Palmera”

Dulidae : Paseriformes

Es endémica de nuestra isla



Decreto 31 de 1987

CONSIDERANDO que la Cigua Palmera es una especie exclusiva de la isla;

CONSIDERANDO que es el único miembro existente de la familia “Dulidae”, de la clase ave;

CONSIDERANDO que es una especie que ofrece un alto interés científico mundial y que todavía se desconoce su relación o parentesco con otras especies de la avifauna;

CONSIDERANDO que dicha especie constituye un patrimonio zoológico del territorio insular;



Pedro Genaro Rodríguez




Jeannie Fraser

**Son aves arbóreas, ruidosas, gregarias,
sociales y coloniales.**

Se pueden encontrar en todo tipo de hábitat y alimentarse especialmente de frutas, aunque comen también insectos, entre otros.

**Hacen nidos
comunales y
usados por varias
parejas en donde
cada una tiene su
propia casa.**

(es como si fuera un
complejo de viviendas con
muchos apartamentos)



Anne Laudisoit



Generalmente se puede reproducir todo el año,
pero la temporada fuerte es de marzo a junio.

Pone de 2 a 4 huevos, con un período
de incubación de 14-16 días.





**¿Preguntas
o
comentarios?**